

Hướng dẫn sử dụng Cansema®

"Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng!"

Phiên bản đầy đủ

Ghi chú: Dòng sản phẩm Cansema® đã được chúng tôi đổi tên thành **Amazon Black Topical Salve**. Tuy nhiên vì lý do lịch sử và đa số người sử dụng sản phẩm của chúng tôi đều biết và quen thuộc với tên gọi Cansema® nên chúng tôi vẫn giữ nguyên tên gọi của hướng dẫn này là “**Hướng dẫn sử dụng Cansema®**”. Và hướng dẫn này áp dụng cho dòng sản phẩm **Amazon Black Topical Salve** được giới thiệu trên các trang web chính thức của chúng tôi là www.alphaomegalabs.com và www.herbhealers.com (trang web cho thị trường Mỹ và Canada).

Định nghĩa y khoa “chữa lành” có nghĩa là bệnh không lặp lại trong vòng 5 năm sau sau khi chữa bệnh. Theo định nghĩa được dùng trong y học chính thống, **Cansema®** thực sự là một phương thuốc chữa ung thư da được chứng thực bằng thực tế cho đa số những người đã dùng sản phẩm này theo đúng hướng dẫn của chúng tôi. Lịch sử của **Cansema®** nói riêng và các loại thuốc mỡ làm đóng vảy (scab) nói chung được trình bày trong Tập 1 và 2 của [Meditopia®](#).



CHÚ Ý: Có nhiều kẻ làm giả **Cansema®** dùng thương hiệu, thông tin, hình ảnh và ngay cả chứng thực của người sử dụng của chúng tôi, mặc dù họ không liên quan gì đến chúng tôi cả; công thức của họ không hoàn toàn giống như công thức của chúng tôi và đặc tính sản phẩm của họ không đạt tiêu chuẩn của hàng thật. Chúng tôi lập danh sách những kẻ làm giả trên trang **Chương trình bồi hoàn hàng nhái (Fake Program Compensation Program)** của chúng tôi. Chúng tôi biết một trong số những kẻ làm giả nhận được sự hỗ trợ của FDA để làm 1 thương hiệu giả - một công ty do Jennifer Wilson / George Ackerson điều hành. [Những người này nói với công chúng rằng họ là chúng tôi.](#) Những người này cũng đề nghị sử dụng “**Hướng dẫn sử dụng Cansema®**” này. Đừng tin họ! Chúng tôi không và sẽ không cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng cho những sản phẩm của họ.

CẢNH BÁO: Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này trước khi sử dụng **Cansema®**. Không nên làm trái với hướng dẫn này theo bất cứ cách nào. Nếu bạn có câu hỏi sau khi đã đọc kỹ, xin hãy gọi cho **Alpha Omega Labs** hoặc liên lạc với đối tác chính thức của chúng tôi để làm rõ. Hãy nhớ rằng, **Cansema®** chỉ cho kết quả nếu bạn bị ung thư da, bao gồm **basal cell carcinoma (BCC - Ung thư tế bào đáy)**, **squamous cell carcinoma (SCC - Ung thư biểu mô tế bào vảy)** và **melanoma (Ung thư tế bào hắc tố)**. **Cansema®** không có tác dụng đối với các khối u lành tính. ■ Để biết thông tin về cách xử lý các nốt ruồi và mụn cóc lành tính xin xem [Bloodroot Paste](#).



--- (1) CHUẨN BỊ ---

Trước hết, người dùng có thể muốn làm sinh thiết (biopsy) hoặc một phương pháp chẩn đoán khác để chắc chắn mình có bị ung thư da hay không.



Nhiều người sau khi nhận thấy họ có 1 nốt ruồi hoặc một vết khác thường trên da có sự gia tăng về kích thước và sẫm màu hơn theo thời gian đã chọn dùng **Cansema**[®]. Họ làm thế vì **Cansema**[®] hoạt động một cách có chọn lọc. Nó chỉ “tấn công” những mô bị ung thư. Các mô khỏe mạnh chỉ ửng đỏ và hơi bị rát sau khi bôi **Cansema**[®]. Quyết định này hoàn toàn tùy thuộc vào sự suy xét của người dùng; hoàn toàn không nguy hiểm, không độc hay tác hại nào khác nếu bôi **Cansema**[®] lên vùng mô da khỏe mạnh, mặc dù làm như vậy chỉ đơn giản là hoang phí sản phẩm mà thôi.

Ngoài ra, nếu bạn muốn xử lý nhiều hơn một vùng da có vấn đề, hãy xử lý lần lượt từng vùng một.



CHUẨN BỊ THUỐC MỠ CANSEMA[®] TRƯỚC KHI BÔI: Vài loại thuốc mỡ làm đóng vảy, bao gồm cả **Cansema**[®] dùng chất đóng vảy, do đó để có kết quả tốt nhất bạn cần phải khuấy thuốc trong lọ một vài giây trước khi dùng. Đối với lọ nhỏ (22 gr) bạn có thể dùng tăm để khuấy. Đối với lọ lớn hơn (102gr) có thể dùng que kem. Sau khi khuấy kỹ bạn sẽ thấy bề mặt của thuốc thay đổi từ màu đen sang màu xanh đậm. Mức độ đông đặc của thuốc sau khi khuấy đều cho kết quả tốt nhất.

Ghi chú về độ đông đặc của thuốc: Không phải ai cũng muốn độ đông đặc của thuốc mỡ như ở trong hộp. Một vài người dùng cho rằng lọ **Cansema**[®] đặc hơn so với họ muốn. (Thuốc có thể đặc hơn nếu không đậy nắp và bị khô). Giải pháp để làm loãng thuốc rất đơn giản. Vì **Cansema**[®] tan trong nước, do đó chỉ cần cho thêm vài giọt nước sạch rồi sau đó khuấy kỹ lại. Mức độ hiệu quả của **Cansema**[®] sẽ không thay đổi đáng kể nếu làm như vậy.

--- (2) BÔI THUỐC ---



Cansema® được đóng lọ theo 2 loại, 22gr và 102gr. Ở trong lọ sản phẩm này giống như một bột nhão dày và ẩm ướt. Có thể dễ dàng bôi bằng ngón tay và xoa đều để **Cansema®** phủ một lớp mỏng lên về mặt vùng da bị thương tổn / bị ung thư. Cần phải rửa sạch tay trước và sau khi dùng **Cansema®**.

Khu vực da được bôi sẽ bắt đầu có cảm giác giống như bị kiến cắn hay bị kim chích nhẹ sau khi bôi – đầu đó sau khoảng 5 phút cho đến 6 giờ kể từ

khi bắt đầu bôi thuốc. (Trong thực tế, nếu bạn không cảm thấy gì cả sau 3 đến 6 giờ thì gần như chắc chắn là sẽ không có gì xảy ra sau đó nữa. Trong trường hợp này **Cansema®** đã không thể tiếp xúc với các tế bào ung thư. Sau 24 giờ, bạn có thể rửa lớp thuốc đã bôi và sau đó bôi lại. Bạn có thể tiếp tục quá trình này cho đến khi **Cansema®** thấm đến lớp mô dị thường (ung thư) và tạo ra lớp vảy (để tách các mô bị ung thư ra khỏi phần mô khỏe mạnh). Thông thường, cần bôi thuốc 1 đến 4 lần để tạo ra lớp vảy từ phần da bị ung thư. Tuy nhiên, nếu vùng da bị ung thư là lớn hơn đáng kể thì có thể phải cần thực hiện 2 hoặc 3 chu kỳ tạo vảy để xử lý triệt để toàn bộ vùng da vị ung thư). ■ Trong vài trường hợp, nếu kích thước vùng bị tổn thương là lớn thì có thể có cảm giác đau rất ở vùng bôi thuốc. Do đó bạn nên chuẩn bị sẵn Ibuprofen hoặc là một loại thuốc giảm đau tương tự trong quá trình chữa trị. Đối với vùng bị tổn thương có kích thước lớn hơn 1 cm² thì có thể cần phải dùng loại thuốc giảm đau mạnh hơn. Nếu loại thuốc giảm đau mạnh hơn này cần phải có kê đơn của bác sĩ mới mua được thì có thể bạn cần phải cần một bác sĩ hợp tác với bạn. Nếu không có bác sĩ hợp tác, bạn cần phải xử lý khu vực bị ung thư theo từng giai đoạn để có thể chịu đựng được cơn đau bị gây ra do phản ứng giữa **Cansema®** với tế bào bị ung thư. Điều này có nghĩa là lúc đầu bạn chỉ bôi **Cansema®** lên rìa của khu vực da bị tổn thương, sau đó đợi cho cơn đau giảm xuống khi quá trình tạo vảy bắt đầu. Sau đó tiếp tục bôi **Cansema®** lên khu vực lân cận cho đến khi toàn bộ khu vực bị tổn thương đều được bôi. Áp dụng đúng quy trình này nếu bạn có nhiều hơn 1 khu vực bị tổn thương. **Mỗi lần chỉ xử lý 1 khu vực.** Bằng cách như vậy, mức độ đau hoặc cảm giác khó chịu sẽ được giảm thiểu vì cả quá trình điều trị thay vì kéo dài trong vài ngày sẽ được chia ra nhiều ngày hơn. Không nên bôi **Cansema®** cho một khu vực rộng lớn trừ khi bạn được chăm sóc và cho lời khuyên làm như vậy bởi một bác sĩ.

Bạn nên dùng 1 miếng gạc y tế để che phủ vùng được bôi thuốc, đặc biệt nếu quá trình tạo vảy diễn ra ở vị trí trên cơ thể dễ bị va chạm, tổn thương trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, **Cansema®** có thể làm bẩn quần áo, do đó bạn nên dùng một miếng vải hợp thẩm mỹ và sạch để che đậy vùng được bôi thuốc.

“... Tôi đã bôi Cansema® và không có tạo vảy! ... Tôi phải làm gì bây giờ?”

Cansema® cần phải tiếp xúc trực tiếp với khu vực có tế bào bị ung thư mới phát huy tác dụng. Nó có tính chất đâm xuyên qua da – một tính chất được tăng cường với sản phẩm [Cansema® - Deep Tissue](#), cũng như các phiên bản Cansema® dành cho [thứ y](#). Tuy nhiên, có một vài mẹo đơn giản có thể giúp đẩy nhanh quá trình này và / hoặc giảm số lượng số lần bôi cần thiết để Cansema® tiếp xúc trực tiếp với tế bào ung thư nằm sau dưới lớp biểu bì. Đa số trường hợp sẽ không cần những kỹ thuật này nếu ung thư nằm gần với bề mặt da. Chúng tôi đề xuất dùng những mẹo này nếu lần bôi đầu tiên không mang lại kết quả. Thực tế rất ít trường hợp phải áp dụng cách này.

“**Chà kỹ bằng bông tắm làm từ xơ mướp**”: Nhiều người dùng bông tắm làm từ xơ mướp để chà kỹ và chuẩn bị lớp da trước khi bôi thuốc mỡ Cansema®. Điều này giúp tẩy một số tế bào chết trên lớp ngoài cùng của biểu bì. Khi đó Cansema® sẽ phải xuyên qua ít tế bào hơn trước khi đi đến lớp tế bào cần phải xử lý.

“**Châm lỗ kim**”: Kỹ thuật này hiệu quả hơn nhưng cũng xâm hại hơn. Điều này đòi hỏi phải dùng 1 kim đã triệt trùng và châm lỗ một cách cẩn thận với độ sâu khoảng 1,6mm đến 3,2 mm giống như châm cứu. Nhưng điều khác ở đây là sau khi châm lỗ rồi thì phải rút kim ra. Thông thường, khoảng cách giữa các lỗ kim khoảng 6mm. Sau khi tạo ra các lỗ này thì Cansema® được bôi lên / bôi lại. Chúng tôi đề xuất kỹ thuật này nên được thực hiện bằng một người hành nghề y tế chứ không phải là người cần được bôi Cansema®. Chúng tôi cũng khuyên người hành nghề y tế chuẩn bị khu vực sẽ được bôi Cansema® bằng cách xát 3 giọt [Lugol's Iodine](#) lên vùng da mới được chích lỗ trước khi bôi / bôi lại Cansema® trong trường hợp người bị ung thư da không bị bệnh tiểu đường (vì người bị tiểu đường kháng Lugol's Iodine) hoặc thay thế bằng dung dịch oxy già (H₂O₂) 3-6%.

--- (3) XỬ LÝ MIẾNG VẢY ---

Sau 24 giờ cần bỏ băng gạc ra. Dùng oxy già 3% và bông ráy tai một cách nhẹ nhàng để làm sạch vùng da bị tổn thương và thuốc mỡ còn lại trên bề mặt cũng như bất cứ vết bẩn được tạo thành (mủ,...) Nếu bạn thấy quá trình tạo thành vết mủ chưa hoàn toàn kết thúc (ví dụ: vết mủ chưa sưng hẳn lên so với bề mặt da xung quanh,



màu sắc của vết mủ chưa đạt đến màu trắng – vàng nhạt đặc trưng) thì cần lặp lại bước 2 và đợi thêm 24 giờ trước khi tiếp tục. Thông thường chỉ cần 1 lần bôi Cansema® là đủ đủ cho các vùng da bị ung thư có kích thước nhỏ (kích thước chỉ vài mm). Các vùng bị ung thư lớn hơn thì có thể đòi hỏi vài lần bôi thuốc. ■ Có những trường hợp mà việc bôi Cansema® phải lặp lại vài lần vì vấn đề tiếp xúc, mặc dù số lần bôi Cansema® có thể được giảm bớt nếu áp dụng những kỹ thuật được đề cập ở khung trong phần 2. Để bắt đầu quá trình tạo vảy và diệt ung thư thì điều cần thiết là Cansema® phải xuyên qua các lớp da lành và tiếp xúc trực tiếp với tế bào bị ung thư. Một lần nữa, quá trình chữa một vùng da bị ung thư có thể cần nhiều lần bôi Cansema® mặc dù thông thường chỉ cần bôi 1 hoặc 2 lần là đủ cho vùng bị ung thư có kích thước nhỏ.

Sau khi vảy được tạo thành thì phải bảo vệ nó. Bạn có thể sử dụng [Sangre de Drago](#), [H3O](#) hoặc [các sản phẩm khác](#) để xử lý vảy mới được tạo thành (H3O được biết dưới tên gọi "Calcium Sulfate Hydronium Solution" đối với người sử dụng sản phẩm của chúng tôi ở Mỹ và Canada). H3O cần được pha loãng bằng nước sạch với tỷ lệ **64:1** để đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương. Tốt hơn là sử dụng H3O sau khi vảy đã rụng rồi mặc dù những báo cáo gần đây cho biết rằng H3O đã được sử dụng trong suốt cả quá trình như là chất để làm sạch giúp đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương và giảm bớt tạo sẹo.

Sau khi làm sạch khu vực tạo vảy thì cần dùng một miếng gạc y tế để che lại nhằm bảo vệ khỏi bụi và các tác nhân có hại khác. Thông thường miếng gạc này có thể để nguyên trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên trong các trường hợp nghiêm trọng thì sẽ có chảy mủ khá nhiều. Vì **Cansema®** diệt tế bào ung thư và lấy bạch cầu là chất làm mưng mủ để dùng trong quá trình tiêu diệt khối u, cho nên việc chảy mủ là hoàn toàn bình thường. Nếu chỉ có rất ít mủ được tạo ra thì có thể chỉ cần dùng 1 miếng gạc. Còn trong trường hợp có chảy mủ nhiều do bị melanoma (ung thư tế bào hắc tố) nặng thì phải thường xuyên thay gạc để đảm bảo vệ sinh. Trường hợp của bạn thường là nằm giữa.

--- (4) LỘT BỎ MIẾNG VẢY ---

Miếng vảy thực chất là khối ung thư đã chết và nó được hình thành không lâu sau khi bôi thuốc. Mọi thứ xảy ra tiếp theo là các phản ứng tự phục hồi của chính cơ thể. Cơ thể của bạn biết nó phải làm gì và không hề phí phạm thời gian để làm điều đó. Mặc dù đối với chúng ta những ngày và tuần sau khi các tế bào ung thư bị tiêu diệt có thể là hơi lâu.

Bước tiếp theo là lột bỏ miếng vảy. Điều này thường xảy ra sau khoảng 10 ngày kể từ khi bôi thuốc lần đầu tiên, ngoại trừ những trường hợp ung thư giai đoạn 3 hoặc 4 ảnh hưởng đến một khu vực lớn. Giống như những miếng vảy của các mụn nhọt, hãy để nó tự rụng ra khi chín muồi. Đừng cố lấy nó ra trước, mặc dù bạn có thể thấy nó chỉ còn dính một chút xíu với vùng da xung quanh mà bạn có thể dễ dàng dứt ra một cách an toàn. Nếu bạn lột bỏ miếng vảy sớm hơn so với đúng thời điểm, bạn có thể gặp vấn đề với việc tạo thành sẹo (thẹo) sau đó. Ngoài ra, nếu thấy miếng vảy lâu rụng ra thì bạn có thể áp dụng những [phương pháp đơn giản để đẩy nhanh quá trình này](#).



--- (5) LẤP ĐẦY VẾT LỖM & LÀNH VẾT THƯƠNG ---



Sau khi miếng vảy rơi ra, vết lõm có thể trông rất thô và xấu xí. Tuy nhiên, nếu vết lõm được che lại và giữ vệ sinh tốt hàng ngày thì sẽ không có nguy cơ bị nhiễm trùng. Nếu bạn phải làm việc trong môi trường không được sạch sẽ thì có thể bạn muốn sử dụng oxy già hoặc [H3O](#) và bôi lên khu vực vết lõm một lần mỗi ngày để diệt các vi khuẩn xâm lấn. Một cách khác là sử dụng [Sangre de Drago](#) – một loại nhựa cây tự nhiên – được bán bởi **Alpha Omega Labs** để đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương.

Sau một vài tháng, trong một vài trường hợp lên đến 2 năm, toàn bộ khu vực sẽ được lành và chỉ còn vấn đề về sẹo. Hiếm khi sẹo trông xấu hay kém thẩm mỹ hơn so với trường hợp bạn chọn phẫu thuật để cắt bỏ khu vực bị ung thư.

Trong đa số các trường hợp ung thư sẽ không quay lại khu vực đã được bôi **Cansema®** ngoại trừ trường hợp có di căn đến đó. Để chắc chắn là khu vực đó đã hoàn toàn sạch khỏi ung thư nhiều người sử dụng chọn cách bôi thêm lần thứ 2, thậm chí lần thứ 3 sau khi đã qua giai đoạn lành vết thương. Chúng tôi không khuyến khích làm điều này một cách thiếu suy xét vì nguy cơ tạo sẹo sẽ tăng thêm sau mỗi lần bôi thuốc. Tuy nhiên, đối với các loại ung thư có tính xâm lấn mạnh, ví dụ như melanoma, người dùng có thể cân nhắc những ưu điểm của việc bôi thuốc lại, đặc biệt là trong trường hợp khu vực ung thư ban đầu nằm ở những vị trí không nhạy cảm về mặt thẩm mỹ hoặc người khác không nhìn thấy (ví dụ: lưng, đùi,...). Việc bôi lại thuốc không nên là biện pháp thay thế cho các phương pháp xét nghiệm ung thư tốt hơn do các bác sĩ có chuyên môn thực hiện.

Nói cách khác, sau khi **Cansema®** kết thúc công việc của nó, thông thường sẽ không có tế bào ung thư còn sót lại từ khối ung thư ban đầu. Quy tắc này có ngoại lệ nếu khu vực ung thư ban đầu có kích thước lớn, và/hoặc nằm sâu dưới da. Hãy nhớ rằng bạn có thể phải lặp lại quá trình này nếu ung thư da của bạn rộng đến mức các tế bào ung thư vẫn còn sót lại sau khi bạn kết thúc chu trình đầu tiên. (Điều này vẫn có thể xảy ra nếu bạn dùng phẫu thuật để cắt bỏ ung thư.) Để chắc chắn, hãy yêu cầu bác sĩ của bạn kiểm tra xem còn lại ung thư tại khu vực đã được xử lý hay không. Có những phương pháp kiểm tra kháng nguyên (antigen marker test) cho kết quả đáng tin cậy mà bác sĩ có thể sử dụng để xác định bạn đã hoàn toàn “sạch” khỏi ung thư hay chưa.

Đối tác tiếng Việt chính thức của chúng tôi là **TS. Nguyễn Minh Hải**. Nếu bạn cần sự hỗ trợ trong việc sử dụng hoặc đặt mua các sản phẩm của **Alpha Omega Labs** xin liên hệ:

- Tel.: +84.988.970.556
- Email: songkhoeitbenh@gmail.com
- Viber, Zalo, WhatsApp: +84.988.970.556

