

Cansema®

的使用说明书

“使用前请仔细阅读！”

“治愈”在医学定义上指的是：疾病在治疗后的五年之内不再复发。根据这个绝对正统的医学定义，加上众多患者遵循我们的说明书敷用Cansema®之后的有效事实证明 - Cansema®是可以治疗皮肤癌的。有关Cansema®的特殊来历以及如何应用它来根除皮肤癌的大致内容可以在 www.meditopia.org 第1章和第2章中找到。

CAUTION: There are numerous

请注意：市面上已经有不少Cansema®仿冒者擅自利用我们的商标，信息，图片 - 甚至我们的见证在销售他们的产品，而实际上他们与我们毫不相干。他们的配方与我们的也绝然不同；加上他们产品的实际功效与文章上所描绘的大大离谱！在我们列出的假冒名单里 - 其中就有一个受着FDA（美国食品和药物管理局）怂恿的冒牌版本（请查看 http://www.altcancer.com/compensation_for_fake_product.htm）。甚至本页Cansema®的使用说明书，目前也被詹尼弗·威尔逊/乔治·阿克森运作的公司广泛利用 - 而且向公众宣布，他们就是我们。那些全都是骗局 请千万不要上当。我们不会也绝不可能为他们的产品及客户提供任何服务。

。

警告：在使用Cansema®膏药前一定要仔细阅读以下说明 - 无论在任何情况下都不要偏离说明书，一旦你读了以后还有问题存在请打电话给阿尔法欧米茄以获取正确的解答。记住，Cansema®药膏只是针对皮肤癌患者提供疗效，这包括基底细胞和鳞状细胞癌及皮肤的黑色素瘤。并不针对增长的良性肿瘤。有关替代良性痣和疣的信息，请参考 <http://www.altcancer.net/bpaste.htm>

--- (1) 准备 ---

正如上面提及，患者很有必要先做个活检或其他试验来诊断确定是否真患有皮肤癌。

不少人一旦看到自己皮肤上长出“痣”或类似的东西，尤其当颜色变得越来越黑时，就会选择Cansema®来敷用，结果发现，Cansema®只选择进入恶性肿瘤（癌）组织起作用。而良性组织用后只不过会出现变红，发痒症状。虽然Cansema®不会对健康组织产生任何伤害，也不具毒性或副作用但实在没必要只是白白地浪费了，至于选择用还是不用当然还是完全由患者自己决定了。

另外，如果治疗的部位不止一处，那就需要一处一个地方的对付。

预备 CANSEMA®SALVE：这类膏药（Cansema®也不例外），很少使用乳化剂，所以要想让Cansema®达到最佳效果，最好在敷用前花一点时间搅拌。若在较小的（22 G）器皿里，选用牙签搅拌就行了；而在“临床器皿大小”的罐子里用雪糕棒搅拌最合适。只要用力快速搅拌，你会发现，原来蓬松的黑色表面

居然变成了光溜溜的深绿色的奶霜。当然后者使用起来肯定效果会更好。

注意一致性的变更：膏药的稠密度每个人想要的都不一样。有些用户会觉得他们的Cansema®过于稠密（如果让Cansema留在外面干燥后也会变稠）。若想要让它变薄，很简单 – 因为Cansema®是水溶性的，只要添加几滴水，使劲搅拌，很快就会调成您想要的稠密度而且不会影响它的功效及力度。

--- (2) 敷用 ---

Cansema®自带两个小的22克（大概0.8盎司）和“临床大小”102克（约3.6盎司）的罐子。该药膏是具有一定湿润度。用手指挖出后很容易薄薄地敷在病变的癌组织部位，轻轻地抹上象“结块”似的。在使用Cansema®前后一定得把手洗得干干净净的。

就在敷上药膏5分钟至6小时之内局部可能出现发麻。（一旦超过三至六个小时还不见任何反应估计也不会再有什么新动静，这都属于正常。如果Cansema®膏药无法接触到癌细胞，那么24小时后您要去掉原来涂上的Cansema®膏药。重新敷上新的，重复整个过程，直到Cansema®渗透到变异部位。）有时可能会有大片灼热感出现，如果预备一些止痛药如布洛芬或其他非处方镇痛药在身边倒是蛮有必要的。

如果局部范围大于一平方厘米（或超过美金的“一毛钱”），就可能需要更强的止痛药，得让医生开处方。还有，为了减轻疼痛可以将癌症处分区域处理。先敷在局部增长的边缘，等不适感过去后，焦痂产生了，再移到旁处重复敷用过程，直到整个变异部位全被覆盖。如果皮肤癌不止一处那么就一次对

付一处这样会尽量减少不适感，如此重复当然会持续好几天但宁愿小面积地由点普及到面也绝不要一下子大面积地敷用Cansema®膏药除非有医生的专门指点。

另外使用绷带也是个好主意，尤其是那些成形了的焦痂位于身体活动较多的部位特别容易受到碰触。加上还需要留意的是，Cansema®会染色到衣服上，所以为了方便，美观和干净用绷带覆盖实在是值得考虑的。

"... I applied Cansema® and

我用了Cansema®药膏并没出现焦痂，该怎么办？”

Cansema®膏药只有当它接触到癌症部位时才开始起作用。它的渗透性（即穿透皮肤的能力） - 在Cansema® - Deep Tissue

(http://www.altcancer.net/cansema_deep.htm 和动物版本这两者内都增强提高了。另外，还有两个简单的技巧也能加快治疗进程，来减少敷用的次数，尤其针对表皮以下的癌症。虽然大多数皮肤癌患者并不都需要用这两种技巧因为他们的只长在皮肤的表面。以下的窍门我们只建议那些极个别的经过最初疗程后没有见到效果的少数患者采用。

"Deep Loufah Wash"

“深度清洗” - 在敷用Cansema®药膏之前许多人用丝瓜茎认真搓洗以除掉表皮上层的死皮，这样Cansema®膏药就可以很快地直接渗进潜在的癌变组织。

"Needle Points"

“针扎” - 该技巧极其有效，而且更深入。用消毒后的无菌针头小心翼翼地把皮肤扎出孔 - 约1mm深，很象针灸师扎针似的 - 只 不过扎了之后马上将针头拔出皮肤，彼此相隔一点。在这新建的“皮肤洞”上重新敷用Cansema®药膏。建

议这个方式让专业医生或护士来做，病人自己不要做。同时在敷用 Cansema®膏药之先专业人员最好在那新扎孔的皮肤上抹上三滴Lugol's（卢戈氏），糖尿病人绝对禁用这个方式，可以用过氧化氢（3-6%）来替代。

---（3）处理焦痂---

24小时之后解下绷带。用棉签沾些氧化氢（H₂O₂ - 3%，大多数药店都能买到）涂在病变处，同时擦掉剩余的Cansema®药膏及脓液等。如果脓液形成并不明显或不完整，请重复步骤2，然后继续保留另外24小时。通常敷用一次就能足够应付小肿瘤（铅笔橡皮的大小），但对于较大肿瘤也不用超过三次。当然也有例外的，就是似乎有障碍不易渗透快的情况那么反复敷用Cansema®就成为必要的了 - 当然也别忘了引用前一节描述过的技巧来帮助。至关重要的是让Cansema®膏药渗进皮肤达到患处，加快结痂以干掉癌症，可以敷用多次（三次或更多），但敷上一到两次是最为普遍的。

After the eschar has formed, keep it well protected.

一旦焦痂形成，需要好好保护。您可以添用维生素E软膏，桑格雷德克德拉戈，或H3O（在美国和加拿大市场被称为“硫酸钙离子解决方案”）。H3O应该用纯净水来稀释（在64：1的比例），以加速愈合，最好在去根之后使用H3O那效果会更好。（最近已经提交上的报告曾提及H3O作为清洗剂如果在整个过程中使用会起到加速愈合和减少疤痕的作用）

通常情况下，绷带可以保留10天左右。然而，在晚期病例中，会有一些“排水”出现，那就是稳定的脓液排放。在Cansema®杀死癌细胞的同时好像

需要相当的白细胞（维护白血球）与它一起杀死肿瘤，转化成脓液然后排出体外，这是很正常并非奇怪的现象。如果流脓不多只要用一次绷带就行了，但对于癌症的晚期就需要多次定期更换绷带。也许您的情况会介于这两者之间。

---（4）拆除焦痂---

焦痂的形成本身意味着肿瘤的死亡，这在敷用后不久就会出现。要看各人自身的反应及恢复能力。由此开始，身体自己会积极地做愈合工作决不浪费时间。但是，接下去的几天和几周还是会显得蛮长的。

下一阶段是除去焦痂或痂。这通常在最初使用后10天以内，除非是晚期和/或癌症（多个）覆盖大面积的身体。正如任何结痂，让它自己成熟掉落。虽然您会发现那连接皮肤组织的小线头可以轻而易举地剪断，但也不要剥落过早。因为过早剥落焦痂，只会增加疤痕再生的风险。

---（5）“去除癌变之后”及“痊愈”---

焦痂掉落之后，患处会显得难看。不过，只要遮盖好，保持良好的日常卫生习惯，就不会有并发感染的威胁。万一您所处的环境不怎么干净，就需要备些过氧化氢（大多药店都有）或H₂O₂，每天一次涂足在患处就能杀死所有可能出现的细菌。另外也可以使用阿尔法欧米茄实验室提供的桑格雷德克德拉戈的天然木材树脂，这还能加速愈合过程。

几个月，某些情况甚至需要两年之后，整个部位才会得到痊愈，可能会留下一些浅淡的疤痕，但不会比动过手术后的疤痕那么难看。

在大多数情况下，受于治疗部位癌症不会“复发”，除非已有潜在的转移。为确保该部位不再有癌细胞存留，许多患者在痊愈之后重新又开始第二次，甚至第三次疗程。我们不认为有必要，并不提倡。因为多一个疗程就有多增加伤

疤的风险。然而，对于迅速增长的癌症，如黑色素瘤，患者可以考虑本产品的潜在好处，尤其是那些长在不透露的隐秘部位（如背部，大腿处等）。以上所有的一切都不应该取代能够从医生处得到的新行有效的抗癌产品。

换句话说，一旦Cansema®完成了它的工作，癌细胞通常不会从原来病变处剩留下来。但这并不包括那些长得又大又深的皮肤癌，另外反复产生及生存过久的案例并不包括在其中。切记，一旦皮肤癌已经转移，（特别是做过皮肤癌切除手术的），那就可能需要重新整个疗程。为了谨慎起见，还是找医生检查一下来确保再也没有癌细胞的在。