

Hướng dẫn sử dụng Cansema®

"Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng!"

Phiên bản ngắn gọn

(Để biết đầy đủ thông tin, xin xem "Hướng dẫn sử dụng Cansema®"- phiên bản đầy đủ)

Ghi chú: Dòng sản phẩm Cansema® đã được chúng tôi đổi tên thành **Amazon Black Topical Salve**. Tuy nhiên vì lý do lịch sử và đa số người sử dụng sản phẩm của chúng tôi đều biết và quen thuộc với tên gọi Cansema® nên chúng tôi vẫn giữ nguyên tên gọi của hướng dẫn này là "**Hướng dẫn sử dụng Cansema®**".

--- (1) CHUẨN BỊ ---



CHUẨN BỊ THUỐC MỠ CANSEMA® TRƯỚC KHI BÔI: Để có kết quả tốt nhất bạn cần phải khuấy thuốc trong lọ một vài giây trước khi dùng. Đối với lọ nhỏ (22 gr) bạn có thể dùng tăm để khuấy. Đối với lọ lớn hơn (102gr) có thể dùng que kem. Sau khi khuấy kỹ bạn sẽ thấy bề mặt của thuốc thay đổi từ màu đen sang màu xanh đậm. Mức độ đông đặc của thuốc sau khi khuấy đều cho kết quả tốt nhất.

--- (2) BÔI THUỐC ---

Có thể dùng ngón tay để lấy thuốc từ trong lọ và xoa đều để Cansema® phủ một lớp mỏng lên về mặt vùng da bị thương tổn / bị ung thư. Cần phải rửa sạch tay trước và sau khi dùng Cansema®.



Khu vực da được bôi sẽ bắt đầu có cảm giác giống như bị kiến cắn hay bị kim chích nhẹ sau khi bôi – đau đó sau khoảng 5 phút cho đến 6 giờ kể từ khi bắt đầu bôi thuốc. Thông thường, cần bôi thuốc 1 đến 4 lần để tạo ra lớp vảy từ phần da bị ung thư.

Tuy nhiên, nếu vùng da bị ung thư là lớn hơn đáng kể thì có thể phải cần thực hiện 2

hoặc 3 chu kỳ tạo vảy để xử lý triệt để toàn bộ vùng da vị ung thư. ■ Trong vài trường hợp, nếu kích thước vùng bị tổn thương là lớn thì có thể có cảm giác đau rất ở vùng bôi thuốc. Do đó bạn nên chuẩn bị sẵn Ibuprofen hoặc là một loại thuốc giảm đau tương tự trong quá trình chữa trị. Đối với vùng bị tổn thương có kích thước lớn hơn 1 cm² thì có thể cần phải dùng loại thuốc giảm đau mạnh hơn. Nếu loại thuốc giảm đau mạnh hơn này cần phải có kê đơn của bác sĩ mới mua được thì có thể bạn cần phải cần một bác sĩ hợp tác với bạn. Nếu không có bác sĩ hợp tác, bạn cần phải xử lý khu vực bị ung thư theo từng giai đoạn để có thể chịu đựng được cơn đau bị gây ra do phản ứng giữa **Cansema®** với tế bào bị ung thư. Điều này có nghĩa là lúc đầu bạn chỉ bôi **Cansema®** lên rìa của khu vực da bị tổn thương, sau đó đợi cho cơn đau giảm xuống khi quá trình tạo vảy bắt đầu. Sau đó tiếp tục bôi **Cansema®** lên khu vực lân cận cho đến khi toàn bộ khu vực bị tổn thương đều được bôi. Áp dụng đúng quy trình này nếu bạn có nhiều hơn 1 khu vực bị tổn thương. **Mỗi lần chỉ xử lý 1 khu vực.** Không nên bôi **Cansema®** cho một khu vực rộng lớn trừ khi bạn được chăm sóc và cho lời khuyên làm như vậy bởi một bác sĩ.

Bạn nên dùng 1 miếng gạc y tế để che phủ vùng được bôi thuốc, đặc biệt nếu quá trình tạo vảy diễn ra ở vị trí trên cơ thể dễ bị va chạm, tổn thương trong sinh hoạt hàng ngày. Ngoài ra, **Cansema®** có thể làm bẩn quần áo, do đó bạn nên dùng một miếng vải hợp thẩm mỹ và sạch để che đậy vùng được bôi thuốc.

--- (3) XỬ LÝ MIẾNG VẢY ---

Sau 24 giờ cần bỏ băng gạc ra. Dùng oxy già 3% và bông ráy tai một cách nhẹ nhàng để làm sạch vùng da bị tổn thương và thuốc mỡ còn lại trên bề mặt cũng như bất cứ vết bẩn được tạo thành (mủ,...) Nếu bạn thấy quá trình tạo thành vết mủ chưa hoàn toàn kết thúc thì cần lặp lại bước 2 và đợi thêm 24 giờ trước khi tiếp tục.



Sau khi vảy được tạo thành thì phải bảo vệ nó. Bạn có thể sử dụng [Sangre de Drago](#), [H3O](#) hoặc [các sản phẩm khác](#) để xử lý vảy mới được tạo thành. H3O cần được pha loãng bằng nước sạch với tỷ lệ **64:1** để đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương.

Sau khi làm sạch khu vực tạo vảy thì cần dùng 1 miếng gạc y tế để che lại nhằm bảo vệ khỏi bụi và các tác nhân có hại khác. Nếu có chảy mủ nhiều thì phải thường xuyên thay gạc để đảm bảo vệ sinh.

--- (4) LỘT BỎ MIẾNG VẢY ---

Miếng vảy thực chất là khối ung thư đã chết và nó được hình thành không lâu sau khi bôi thuốc. Mọi thứ xảy ra tiếp theo là các phản ứng tự phục hồi của chính cơ thể.

Miếng vảy thường rụng ra sau khoảng 10 ngày kể từ khi bôi thuốc lần đầu tiên, ngoại trừ những trường hợp ung thư giai đoạn 3 hoặc 4 ảnh hưởng đến một khu vực lớn. Giống như những miếng vảy của các mụn nhọt, hãy để nó tự rụng ra khi chín muồi.

Đừng cố lấy nó ra trước. Nếu bạn lột bỏ miếng vảy sớm hơn so với đúng thời điểm, bạn có thể gặp vấn đề với việc tạo thành sẹo (thẹo) sau đó. Ngoài ra, nếu thấy miếng vảy lâu rụng ra thì bạn có thể áp dụng những [phương pháp đơn giản để đẩy nhanh quá trình này](#).



--- (5) LẤP ĐẦY VẾT LỖM & LÀNH VẾT THƯƠNG ---



Sau khi miếng vảy rơi ra, vết lõm có thể trông rất thô và xấu xí. Tuy nhiên, nếu vết lõm được che lại và giữ vệ sinh tốt hàng ngày thì sẽ không có nguy cơ bị nhiễm trùng. Nếu bạn phải làm việc trong môi trường không được sạch sẽ thì có thể bạn muốn sử dụng oxy già hoặc [H3O](#) và bôi lên khu vực vết lõm một lần mỗi ngày để diệt các vi khuẩn xâm lấn. Một cách khác là sử dụng [Sangre de Drago](#) để đẩy nhanh quá trình làm

lành vết thương.

Sau một vài tháng, trong một vài trường hợp lên đến 2 năm, toàn bộ khu vực sẽ được lành và chỉ còn vấn đề về sẹo.

Đối tác tiếng Việt chính thức của chúng tôi là **TS. Nguyễn Minh Hải**. Nếu bạn cần sự hỗ trợ trong việc sử dụng hoặc đặt mua các sản phẩm của **Alpha Omega Labs** xin liên hệ:

- Tel.: +84.988.970.556
- Email: songkhoeitbenh@gmail.com
- Viber, Zalo, WhatsApp: +84.988.970.556

